



Studiu clinic multicentric controlat în dublu-orb Oscilloccinum® vs. Placebo asupra eficacității demonstrate în tratarea stărilor instalate⁽¹⁾

Metodologie și descrierea pacienților (grupului țintă)

- Studiul clinic dublu-orb, Oscilloccinum® vs Placebo
- Posologie și durata de urmărire a pacienților: Grupul țintă - au primit fie 1 doză Oscilloccinum® de 2 ori pe zi, dimineața și seara, fie placebo.


Grupul țintă:

> **372 pacienți**

- media de vârstă: **35 de ani** (12 - 60 ani) prezentând sindrom gripal de cel puțin 24 de ore
- repartizați în **2 grupe** de administrare, astfel:
188 - Oscilloccinum® și **184** - placebo
- cu: **T° ≥ 38°C**, cefalee, curbaturi și cel puțin un alt simptom (frisoane, artralgie, tuse, rinoree, angină, oboseală)

Rezultate

Compararea simptomelor după 48 de ore



- **Oscilloccinum®**: **62,9%** pacienții din grupa Oscilloccinum s-au vindecat sau au înregistrat ameliorări semnificative
- **Grup Martor**: **48,5%** pacienții din grupa placebo s-au vindecat sau au înregistrat ameliorări semnificative

Concluzii

Statistic, la pacienții tratați cu **Oscilloccinum®**:

- numărul de vindecări este **semnificativ mai mare** (p<0,005)
- vindecarea a **survenit mai repede** (p<0,05)